



32. BESKYDSKÝ ORL DEN

6.-7. 11. 2026

Horský hotel Sepetná, Ostravice

Česká společnost ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

pod záštitou

Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNO a LF OU

Téma

Obezita v ORL praxi

„Když kilogramy ovlivňují dýchání, spánek i chirurgické výsledky.“



VÍTEJTE ZPĚT

PRO ŽIVOT S PŘETRÝVAJÍCÍ
KONTROLOU CRSwNP

S PŘÍPRAVKEM DUPIXENT MAJÍ PACIENTI S CRSwNP ŠANCI DOSÁHNOUT SKUTEČNÝCH VÝSLEDKŮ

Jediná biologická léčba zacílená na signalizaci IL-4 a IL-13
ke snížení zánětu typu 2 u CRSwNP¹⁻³

INDIKACE:¹ CHRONICKÁ RINOSINUSITIDA S NOSNÍ POLYPÓZOU

Přípravek Dupixent je indikován jako přídavná terapie k intranazálním kortikosteroidům k léčbě dospělých s těžkou CRSwNP, u nichž terapie systémovými kortikosteroidy a/nebo chirurgický zákrok nezajišťují dostatečnou kontrolu onemocnění.¹

CRSwNP, chronická rinosinusitida s nosní polypózou.

DUPIXENT®
(dupilumab)

Reference: 1. SPC Dupixent, datum revize textu 9. 7. 2026. 2. Gandhi NA, Bennet BL, Graham NMH, Pirozzi G, Stahl N, Yancopoulos GD. Targeting key proximal drivers of type 2 inflammation in disease. *Nat Rev Drug Discov.* 2016;15(1):35-50. doi:10.1038/nrd4624. 3. Schleimer RP. Immunopathogenesis of chronic rhinosinusitis and nasal polyps. *Annu Rev Pathol.* 2017;12:331-357. doi:10.1146/annurev-pathol-052016-100401.

Zkrácená informace o přípravku

Název přípravku: Dupixent 200 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce / v předplněném peru, Dupixent 300 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce / v předplněném peru. **Léčivá látka:** Dupilumab. **Indikace:** *Atopická dermatitida (AD):* Dupixent je indikován k léčbě středně těžké až těžké AD u dospělých a dospívajících ve věku od 12 let a starších, kteří jsou vhodnými kandidáty na systémovou terapii, a k léčbě těžké atopické dermatitidy u dětí ve věku od 6 měsíců do 11 let, které jsou vhodnými kandidáty na systémovou terapii. *Astma:* Dupixent je indikován jako přídavná udržovací léčba u dospělých, dospívajících od 12 let a dětí ve věku od 6 do 11 let s těžkým astmatem se zánětem typu 2 charakterizovaným zvýšeným počtem eozinofilů v krvi a/nebo zvýšením množství exhalovaného oxidu dusnatého (FENO), jejichž nemoc není dostatečně kontrolována inhalačními kortikosteroidy (IKS) ve vysokých dávkách (v případě dětí od 6 do 11 let ve středních až vysokých dávkách) a dalším léčivým přípravkem k udržování léčby. *Chronická rinosinusitida s nosní polypózou (CRSwNP):* Dupixent je indikován jako přídavná terapie k intranazálním kortikosteroidům pro léčbu dospělých s těžkou CRSwNP, u nichž terapie systémovými kortikosteroidy a/nebo chirurgický zákrok nezajišťují dostatečnou kontrolu onemocnění. *Prurigo nodularis:* Přípravek Dupixent je indikován k léčbě středně těžké až těžké prurigo nodularis (PN) u dospělých, kteří jsou vhodnými kandidáty pro systémovou terapii. *Eozinofilní eozinofilitida (EoE):* Přípravek Dupixent je indikován k léčbě eozinofilní eozinofilitidy u dospělých, dospívajících a dětí ve věku od 1 roku s tělesnou hmotností alespoň 15 kg, jejichž onemocnění není dostatečně kontrolováno konvenční léčbou, netolerují ji nebo kteří nejsou pro konvenční léčbu vhodnými kandidáty. *Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN):* Dupixent je indikován u dospělých pacientů jako přídavná udržovací léčba nekontrolované chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) charakterizované zvýšeným počtem eozinofilů v krvi v kombinaci s inhalačním kortikosteroidem (IKS), dlouhodobě působícím beta₂-agonistou (LABA) a dlouhodobě působícím muskarinovým antagonistou (LAMA) nebo v kombinaci s LABA a LAMA, nejsou-li IKS vhodné. *Chronická spontánní urtikarie (CSU):* Přípravek Dupixent je indikován k léčbě středně těžké až těžké chronické spontánní urtikarie u dospělých, dospívajících a dětí (ve věku od 2 let) s nedostatečnou odpovědí na H1-antihistaminika a kteří dosud nebyli léčeni anti-IgE terapií CSU. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku. **Dávkování a způsob podání subkutánní injekce:** *Atopická dermatitida:* Doporučená úvodní dávka dupilumabu u dospělých pacientů je 600 mg, následovaná dávkou 300 mg každý druhý týden formou subkutánní injekce. U dospívajících pacientů ve věku od 12 do 17 let s hmotností méně než 60 kg: úvodní dávka 400 mg, následovaná dávkou 200 mg každý druhý týden. U dospívajících s hmotností 60 kg nebo více: úvodní dávka 600 mg, následovaná dávkou 300 mg každý druhý týden. U dětí ve věku od 6 do 11 let s hmotností 15 kg až méně než 60 kg: úvodní dávka 300 mg v den 1, následovaná dávkou 300 mg v den 15, následovaná dávkou 300 mg každé 4 týdny (Q4W), počínaje 4 týdny po dávce podané v den 15. Dávka může být u pacientů s tělesnou hmotností 15 kg až méně než 60 kg na základě posouzení lékařem zvýšena na 200 mg Q2W. U dětí ve věku 6 až 11 let s hmotností 60 kg nebo více: úvodní dávka 600 mg, následovaná dávkou 300 mg každý druhý týden. U dětí ve věku od 6 měsíců do 5 let s hmotností 5 až méně než 15 kg: úvodní dávka 200 mg, následovaná dávkou 200 mg každé 4 týdny. U dětí ve věku od 6 měsíců do 5 let s hmotností 15 až méně než 30 kg: úvodní dávka 300 mg, následovaná dávkou 300 mg každé 4 týdny. Dupilumab v předplněném peru je určen k použití u dospělých a pediatrických pacientů ve věku od 2 let. Dupilumab v předplněné injekční stříkačce je určen k použití u dospělých a pediatrických pacientů ve věku od 6 měsíců. Dupilumab lze používat s topickými kortikosteroidy (TKS) nebo bez nich. U pacientů, u nichž nebyla po 16 týdnech léčby zaznamenána žádná odpověď, je třeba zvážit ukončení léčby AD. *Astma:* Doporučená dávka dupilumabu u dospělých a dospívajících od 12 let a starších: U pacientů s těžkým astmatem užívajících perorální kortikosteroidy nebo u pacientů s těžkým astmatem a komorbidní středně těžkou až těžkou AD nebo u dospělých pacientů s komorbidní těžkou CRSwNP je úvodní dávka 600 mg, následovaná dávkou 300 mg každý druhý týden. U všech ostatních pacientů je úvodní dávka 400 mg, následovaná dávkou 300 mg každý druhý týden podávanou formou subkutánní injekce. U dětí ve věku od 6 do 11 let s hmotností 15 kg až méně než 30 kg: 300 mg každé 4 týdny (Q4W). U dětí ve věku od 6 do 11 let s hmotností 30 kg až méně než 60 kg: 200 mg každý druhý týden (Q2W) nebo 300 mg každé 4 týdny (Q4W). U dětí ve věku od 6 do 11 let s hmotností 60 kg nebo více: 200 mg každý druhý týden (Q2W). U pediatrických pacientů (ve věku od 6 do 11 let) s astmatem a komorbidní těžkou atopickou dermatitidou nebo u dětí podle schválené indikace dodržována doporučená dávka uvedená pro atopickou dermatitidu. Pacienti užívající současně perorální kortikosteroidy mohou snížit dávku steroidů, pokud již léčbu dupilumabem došlo ke klinickému zlepšení. Dupilumab je určen pro dlouhodobou léčbu. Potřeba pokračování v léčbě má být zvážena nejméně jednou ročně na základě lékařského vyhodnocení závažnosti příznaků astmatu u pacienta. *CRSwNP:* Doporučená úvodní dávka dupilumabu u dospělých pacientů je 300 mg dupilumabu, následovaná dávkou 300 mg každý druhý týden. Dupilumab je určen pro dlouhodobou léčbu. U pacientů, u nichž nebyla po 24 týdnech zaznamenána žádná odpověď, je třeba zvážit ukončení léčby. *Prurigo nodularis:* Doporučená úvodní dávka dupilumabu u dospělých pacientů je 600 mg (dvě 300mg injekce), následovaná dávkou 300 mg každý druhý týden. Dupilumab lze používat s topickými kortikosteroidy nebo bez nich. *Eozinofilní eozinofilitida:* Doporučená dávka dupilumabu u dospělých pacientů je 300 mg dupilumabu, následovaná dávkou 300 mg každý druhý týden. U dětí ve věku od 6 do 11 let s hmotností 15 kg až méně než 30 kg: 300 mg každé 4 týdny (Q4W). U dětí ve věku od 6 do 11 let s hmotností 30 kg až méně než 60 kg: 200 mg každý druhý týden (Q2W), s tělesnou hmotností 40 kg nebo více je 300 mg každý druhý týden. *CHOPN:* Doporučená dávka dupilumabu u dospělých pacientů je 300 mg, podávaná každý druhý týden. *Chronická spontánní urtikarie:* Doporučená úvodní dávka dupilumabu u dospělých pacientů je 600 mg, následovaná dávkou 300 mg podávanou každý druhý týden. U dětí a dospívajících pacientů ve věku od 6 do 17 let: s hmotností 15 kg až méně než 30 kg: úvodní dávka 300 mg v den 1, následovaná dávkou 300 mg v den 15, následně 300 mg každé 4 týdny (Q4W), počínaje 4 týdny po dávce podané v den 15; s hmotností 30 kg až méně než 60 kg: úvodní dávka 400 mg, následovaná dávkou 200 mg každý druhý týden (Q2W); s hmotností více než 60 kg: úvodní dávka 600 mg, následovaná dávkou 300 mg každý druhý týden. U dětí ve věku od 2 do 5 let: s hmotností 5 kg až méně než 15 kg: úvodní dávka 200 mg každé 4 týdny (Q4W); s hmotností 15 kg až méně než 30 kg: úvodní dávka 300 mg každé 4 týdny (Q4W). **Zvláštní upozornění a opatření pro použití:** Dupilumab není určen k léčbě akutních příznaků ani akutních exacerbací astmatu nebo CHOPN. Dupilumab není určen k léčbě akutního bronchospasmu ani status asthmaticus. Po zahájení léčby dupilumabem se nesmí náhle vysadit systémové, topické či inhalační kortikosteroidy. *Hypersenzitivita:* Pokud dojde k systémové hypersenzitivní reakci (okamžitě nebo opožděně), musí být podávání dupilumabu okamžitě přerušeno a musí být zahájena příslušná léčba. *Eozinofilní stav:* U dospělých pacientů léčených dupilumabem, kteří se zúčastnili programu zaměřeného na vývoj astmatu, byly hlášeny případy eozinofilní pneumonie a případy vaskulitidy konsistentní s eozinofilní granulomatózou s polyangiitidou (EGPA). *Parazitární infekce (helminthózy):* Pacienti se známými parazitárními infekcemi byli vyloučeni z účasti v klinických studiích. Pacienti s již existujícími parazitárními infekcemi mají být léčeni ještě před zahájením léčby dupilumabem. Pokud se pacient nakazí během léčby dupilumabem a nereguluje na antiparazitární léčbu, musí být léčba dupilumabem přerušena, dokud infekce neodezní. *Přihlasy související s konjunktivitidou a keratitidou:* Pacienti léčení dupilumabem, u nichž dojde k rozvoji konjunktivitidy přetrvávající i po standardní léčbě nebo pacienti se známkami a příznaky naznačujícími keratitidu, mají v případě potřeby podstoupit oftalmologické vyšetření. *Komorbidní astma:* Pacienti léčení dupilumabem pro středně těžkou až těžkou AD nebo těžkou CRSwNP, kteří mají také komorbidní astma, nemají upravovat nebo přerušovat léčbu astmatu bez konzultace s lékařem. Pacienti s komorbidním astmatem mají být pečlivě sledováni pro vysazení dupilumabu. *Očkování:* Živé nebo atenuované vakcíny se nemají aplikovat při podávání dupilumabu, protože nebyla stanovena jejich klinická bezpečnost a účinnost. Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků má se přehledně zaznamenat název podaného přípravku a číslo šarže. **Interakce:** V klinické studii u pacientů s AD byly hodnoceny účinky dupilumabu na PK substrátů CYP. Účinek dupilumabu na PK souběžně podávaných léčiv se nepředpokládá. **Fertilita, těhotenství a kojení:** *Těhotenství:* Údaje o podávání dupilumabu těhotným ženám jsou omezené. Dupilumab lze v těhotenství použít pouze tehdy, pokud potenciální přínos převáží potenciální riziko pro plod. *Kojení:* Není známo, zda se dupilumab vylučuje do lidského mateřského mléka nebo zda je systémově absorbován pro perorálním podání. Je třeba rozhodnout, zda je vhodné přerušit kojení nebo přerušit léčbu dupilumabem s přihlédnutím k přínosu kojení pro dítě a přínosu léčby pro ženu. *Fertilita:* Studie na vylučení neprokázaly zhoršení fertility. **Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje:** Dupilumab nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. **Nežádoucí účinky:** Nejčastějšími nežádoucími účinky při léčbě atopické dermatitidy, astmatu a CRSwNP jsou reakce v místě injekce (včetně erytému, edému, pruritu, bolesti a otoku), konjunktivitida, alergická konjunktivitida, artralgie, herpes úst a eozinofilita. Dalšími nežádoucími účinkem hlášenými při léčbě EoE a CHOPN byla modřina v místě injekce. U pacientů s CHOPN a CSU byly hlášeny další nežádoucí účinky, jako je vyrážka v místě injekce, a u pacientů s CSU byl hlášen hematom v místě injekce. Vzácně byly hlášeny případy sérové nemoci, reakce podobné sérové nemoci, anafylaktické reakce a ulcerózní keratitidy. **Předávkování:** Pro předávkování dupilumabem neexistuje žádná specifická léčba. V případě předávkování je třeba u pacienta sledovat jakékoliv známky a příznaky nežádoucích účinků a okamžitě zahájit vhodnou symptomatickou léčbu. **Doba použitelnosti:** 3 roky. **Zvláštní opatření pro uchování:** Uchovávat v chladničce (2°C – 8°C). Chránit před mrazem, uchovávat v původní krabici, aby byl přípravek chráněn před světlem. **Balení:** Dupixent 200 mg v 1,4 ml roztoku a Dupixent 300 mg v 2 ml roztoku v předplněné injekční stříkačce / v předplněném peru. **Registrační čísla:** EU/17/112/29/005-006, 008-010, 012-014, 016-018, 020, 023-028. **Držitel rozhodnutí o registraci:** Sanofi Winthrop Industrie, 82 avenue Raspail, 94250 Gentilly. **Datum poslední revize textu:** 9. 7. 2026. Přípravek Dupixent je vydáván pouze na lékařský předpis, je plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění dospělých pacientů, pediatrických a dospívajících pacientů s těžkou formou atopické dermatitidy od 6 let do 18 let, v léčbě dospělých pacientů s těžkou CRSwNP a v léčbě dospělých a dospívajících pacientů od 12 let věku s těžkým refrakterním eozinofilním astmatem. V indikaci u dětí ve věku od 6 měsíců do 5 let s těžkou formou atopické dermatitidy, u dětí ve věku od 6 do 11 let s těžkým astmatem, prurigo nodularis, eozinofilní eozinofilitida a CHOPN není dosud hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před použitím přípravku se seznámte s úplnou informací o přípravku. **Další informace jsou k dispozici na adrese:** Sanofi s.r.o., Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6, tel.: 233 086 111 nebo na www.sanofi.cz.

sanofi **REGENERON**

MAT-CZ-2600336-2.0-09/2026.
Určeno pro odbornou veřejnost.

Sanofi s.r.o., Generála Píky 430/26,
Dejvice, 160 00 Praha 6
tel.: +420 233 086 111, e-mail: cz-info@sanofi.com

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

srdečně si Vás dovoluujeme Vás pozvat na 32. ročník Beskydských ORL dní. Jedná se již o tradiční podzimní ORL odbornou akci, která se zpravidla nese v duchu mezioborových témat. Máme za to, že mezioborová témata nás výrazně obohacují, přinášejí nové impulzy a umožňují nám vidět pacienta i naši práci komplexně. Jinak tomu nebude ani letos, kdy jsme za hlavní téma zvolili obezitu.

Pozvání přijaly významné osobnosti zabývající se léčbou obezity, mezi jinými MUDr. Evžen Machytka, Ph.D. a MUDr. Jan Boženský, MBA. Probereme, co stojí za "epidemií" obezity a proč se výrazně zvyšuje procento obézních dětí. Dozvíme se jaká anesteziologická rizika představuje obezita, jaké medikamentózní, endoskopické a chirurgické možnosti léčby obezity máme k dispozici a neopomeneme ani psychologické aspekty obezity.

ORL specifická témata se budou věnovat vysazování léků na hubnutí před operaci, předoperační přípravě, indikacím k operacím pro obstrukční spánkovou apnoe u obézních pacientů, pooperační péči, specifikám provádění tracheotomie u obézních pacientů, léčbě subglotických stenóz u obézních pacientů a dalším oblastem.

Věříme, že setkání v Ostravici-Sepetné bude pro nás všechny přínosem nejen po stránce odborné, ale i společenské, upevníme přátelství a společně budeme rozvíjet ORL obor.

Na setkání se těší

prof. MUDr. Karol Zeleník, Ph.D., MBA
přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNO a LF OU

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
emeritní přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNO a LF OU

MÍSTO KONÁNÍ ODBORNÉHO PROGRAMU

Horský hotel Sepetná, Ostravice 0956

POŘADATEL

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

ODBORNÝ GARANT

prof. MUDr. Karol Zeleník, Ph.D., MBA
přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNO a LF OU

TÉMA

Obezita v ORL praxi

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

ARKON produkce
Ing. Šárka Martiníková
U Chatek 1444/1C, 725 25 Ostrava 25

tel.: +420 774 889 264
e-mail: info@beskydskyorlden.cz

CERTIFIKÁTY / Akreditace ČLK

Vzdělávací akce je určena pro lékaře a bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů. Akce bude pořádána dle Vzdělávacího řádu dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Akce bude ohodnocena 8 kredity.

Pro zajištění automatického připisování kreditů lékařům požaduje ČLK po skončení akce nahrání prezenční listiny účastníků vzdělávací akce do portálu. Prezenční listina obsahuje pouze evidenční čísla lékařů, kteří absolvovali danou akci a počet kreditů za akci. Proto je nutné, abyste **při registraci uvedli své IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO LÉKAŘE** dle ČLK (ČLK ID).

Nebude-li vyplněno ČLK ID při registraci, automatické přičítání kreditů tak nebude organizátorem možné zajistit. Pokud své ČLK ID neznáte, můžete ho vyhledat [ZDE](#). My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány. Děkujeme za spolupráci!

Děkujeme všem partnerům a vystavovatelům za podporu, bez jejichž pomoci bychom kongres nemohli pořádat.

GENERÁLNÍ PARTNER



HLAVNÍ PARTNER



PARTNER TISKOVÉ INFORMACE



ODBORNÝ PROGRAM**6. 11. 2026 – pátek**

09.00 – 14.15	Registrace
od 14.00	Ubytování
12.00 – 13.25	Předseminářový workshop
13.45 – 14.00	Přednáška AUDIONIKA s.r.o.
14.15 – 19.15	Odborný panel

Účastníci panelu:

MUDr. Evžen Machytka, Ph.D. (IKEM, Endohope, Harvard, Mayo)

MUDr. Jan Boženský, MBA (Dětské oddělení, Nemocnice AGEL Ostrava – Vítkovice)

MUDr. Ondřej Jor, Ph.D. (KARIM FN a LF OU)

MUDr. Petr Ostruszka, Ph.D. (Chirurgická klinika, FN a LF OU)

PhDr. Petr Nilius, Ph.D. (Ambulance klinické psychologie, Ostrava)

doc. MUDr. Milan Urík, Ph.D. (Klinika dětské ORL, FN Brno)

doc. MUDr. Petr Matoušek, Ph.D., MBA (Klinika ORLCHHK, FN a LF OU)

prof. MUDr. Karol Zeleník, Ph.D., MBA (Klinika ORLCHHK, FN a LF OU)

7. 11. 2026 – sobota

08.00 – 10.00	Poseminářové workshopy
---------------	------------------------

POPLATKY

REGISTRAČNÍ POPLATEK	Včasná registrace do 1. 10. 2026	Pozdní registrace od 2. 10. 2026
Lékař/ka	1.100 Kč	1.600 Kč

V ceně registračního poplatku jsou:

Vstup na odborný program a výstavu, materiály sympozia, potvrzení o účasti, občerstvení o přestávce

SPOLEČENSKÁ VEČEŘE	Registrovaný účastník	Doprovodná osoba
6. 11. 2026 od 20.00 hodin	1.100 Kč	1.200 Kč

Ceny poplatků jsou uvedeny včetně DPH.

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Registraci k účasti na sympozium proveďte prosím vyplněním on-line registračního formuláře na internetových stránkách www.beskydskyorlden.cz.

Po obdržení Vaší registrace, kterou budeme považovat za závaznou, Vám bude zasláno potvrzení o registraci a pokyny k platbě. Registrace bude ukončena po obdržení platby poplatku na účet sympozia.

Pro včasnou platbu je rozhodující datum úhrady.

Věnujte prosím pozornost správnému vyplnění Vaší e-mailové adresy pro následnou správnou komunikaci.

UBYTOVÁNÍ

Ubytování si sami rezervujete přímo v hotelu.

Rezervaci ubytování proveďte na níže uvedených odkazech a následně i uhradte přímo danému hotelu.

Ubytování rezervujte prosím na:

Hotel Sepetná, Bungalovy a Sluníčko: [Rezervace ubytování Sepetná](#)

Hotel Ondráš: info@hotelondras.com

Hotelem Vám bude zasláno potvrzení o rezervaci ubytování a informace k jeho úhradě.

Ceny ubytování vč. DPH	Horský hotel Sepetná	Hotel Ondráš	Hotel Sluníčko
Jednolůžkový pokoj (1 lůžko/1noc)	---	2.340 Kč	2.890 Kč
Dvoulůžkový pokoj (1 lůžko/noc)	1.700 Kč	1.465 Kč	1.700 Kč
Bungalovy Sepetná	3 osoby (1 lůžko / 1 noc)	4 osoby (1 lůžko / 1 noc)	Celý bungalov
Počet osob v bungalovu	1.025 Kč	1.367 Kč	4.100 Kč

Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, TV, telefonem. Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

POPLATEK OBECNÍMU ÚŘADU

Místní poplatek 40 Kč z pobytu za osobu obci Ostravice za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku, je splatný v hotovosti na recepci při příjezdu.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Objednávku ubytování proveďte co nejdříve, kapacita ubytování je limitována!
- Do rezervace uveďte, s kým chcete být na pokoji ubytování, v případě, nebudete-li požadovat ubytování na vícelůžkovém pokoji s konkrétní osobou, budete ubytováni s osobou stejného pohlaví.
- Počet pokojů je omezen, proto se může stát, že Vašemu požadavku na pokoj obsazený jednou osobou nebudeme moci vyhovět, na tuto skutečnost Vás hotel písemně upozorní.
- V případě omezení pořádání vzdělávacích akcí a omezení provozu hotelu z důvodu nepříznivé epidemiologické situace Vám budou platby za ubytování vráceny.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platbu registračního poplatku a večera proveďte na:

Banka	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu	1469890009/2700
Název účtu	Šárka Martiníková Marenová
Variabilní symbol	202608

Platbu kongresových poplatků ze ZAHRANIČÍ (Zahraniční a SEPA platby) proveďte na:

Banka	Československá obchodní banka, a.s.
Stát banky příjemce	Česká republika
IBAN	CZ1103000000000318999328
BIC/SWIFT	CEKOCZPP
Účel platby	DCH
Jméno příjemce	Šárka Martiníková
ID platby	202608

Účastnický poplatek a další objednané služby uhradte bankovním převodem nebo poštovní poukázkou – veškeré náležitosti platby získáte z výše uvedených informací a v odpovědi na Vaši registraci.

UPOZORNĚNÍ

Nebude-li platba za registrační poplatek uhrazena ve stanoveném termínu pro včasnou registraci, bude Váš poplatek za registraci automaticky navýšen.

K registraci si prosím s sebou vezměte doklad o úhradě pro případ nejasností.

Způsob platby

Na místě budeme mít k dispozici platební terminál, ale vzhledem k tomu, že občas v Hotelu bývá horší signál, může být platba kartou komplikovanější. Doporučujeme proto uhradit poplatky ještě před konáním sympozia.

Nebudete-li mít platbu uhrazenou, připravte se na hotovostní platbu a to ve výši poplatku pozdní registrace.

DAŇOVÝ DOKLAD

Po obdržení platby Vám bude daňový doklad odeslán do 14 dnů na e-mailovou adresu uvedenou při registraci.

PODMÍNKY PRO ZRUŠENÍ REGISTRACE

Zrušení Vaší účasti (registrace, večer a ubytování) může být pouze písemnou formou a to na emaily:

REGISTRAČNÍ POPLATEK A VEČER info@beskydskyorlden.cz

UBYTOVÁNÍ

Hotel Sepetná, Sluníčko a bungalovy: zemanikova@sepetna.cz

Hotel Ondráš: info@hotelondras.com

Přijetí Vašeho zrušení registrace Vám bude emailem potvrzeno. Telefonické zrušení nebude akceptováno.

	Vrácení poplatku	100 % z celkové částky
Registrační poplatek a večer	do 31. 10. 2026	od 1. 11. 2026

Ubytování	Vrácení poplatku	50 % z celkové rezervace	100 % z celkové rezervace
Všechna zařízení	do 31.10.2026	1.-5. 11. 2026	od 6. 11. 2026

Vrácení poplatků

Zrušení registrace v termínu bez storno poplatků – jednorázový administrativní poplatek 100 Kč.

Živnost pod IČ 69223335 je zapsána v Registru živnostenského podnikání ČR. Je plátcem DPH.

